

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1)

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1)

De fase 1 indicatoren voor diabetes type 2 zijn vastgesteld door NDF en NHG en worden sinds 2011 uitgevraagd over voorgaande jaren.

Voor aanvullende informatie over tellers en noemers :

<https://www.nhg.org/themas/publicaties/download-indicatoren>

1. HbA1c

1. HbA1c

Indicator 1a: % diabetespatiënten bij wie het HbA1c in de afgelopen 12 maanden is geregistreerd

1. HbA1c

Indicator 1b: % diabetespatiënten met een leeftijd onder de 70 jaar (< 70) en een HbA1c bepaling in de afgelopen 12 maanden en een uitkomst van 53 mmol/mol of lager (≤ 53) in de groep patiënten met diabetes type 2 en een leeftijd onder de 70 jaar (< 70)

1. HbA1c

Indicator 1c: % patiënten met diabetes type 2 en een HbA1c bepaling in de afgelopen 12 maanden en een uitkomst van groter dan 64 mmol/mol (> 64)

2. Bloeddruk

2. Bloeddruk

Indicator 2a: % diabetespatiënten bij wie de bloeddruk in de afgelopen 12 maanden is geregistreerd

2. Bloeddruk

Indicator 2b: % patiënten met diabetes type 2 en een leeftijd jonger dan 80 jaar (< 80 jaar) en een systolische bloeddruk bepaling in de afgelopen 12 maanden met een uitkomst van 140 mm Hg of lager (≤ 140) in de groep patiënten met diabetes type 2 en een geregistreerde bloeddrukbeplating in de afgelopen 12 maanden met een leeftijd jonger dan 80 jaar (< 80)

2. Bloeddruk

Indicator 2c: % patiënten met diabetes type 2 en een systolische bloeddruk > 140 mm Hg en leeftijd jonger dan 80 jaar zonder medicamenteuze behandeling met antihypertensiva

3. Nierfunctie

3. Nierfunctie

Indicator 3a: % diabetespatiënten met urineonderzoek (portie) op albumine of albumine/creatinine ratio in de afgelopen 12 maanden ¹

3. Nierfunctie

Indicator 3b: % diabetespatiënten bij wie een creatinineklaring berekend of geregistreerd is in de afgelopen 12 maanden

3. Nierfunctie

Indicator 3c: % Patiënten met diabetes type 2 en een eGFR tussen 60 ml/min (< 60) en 30 (≥30)

3. Nierfunctie

Indicator 3d: % Patiënten met diabetes type 2 en een eGFR lager dan 30 ml/min (< 30)

4. Lipidenprofiel

4. Lipidenprofiel

Indicator 4a: % diabetespatiënten bij wie een lipidenprofiel (totaal cholesterol en triglyceride en HDL en LDL) is geregistreerd ¹

4. Lipidenprofiel

Indicator 4b: % Patiënten met diabetes type 2 en een leeftijd jonger dan 80 jaar (< 80) en een LDL-cholesterol bepaling in de afgelopen 12 maanden met een uitkomst gelijk aan 2,5 mmol/l of lager (≤ 2,5) in de groep diabetespatiënten met een geregistreerde LDL-bepaling in de afgelopen 12 maanden en een leeftijd jonger dan 80 jaar (<80)

4. Lipidenfunctie

Indicator 4c: % Patiënten met diabetes type 2 die een lipidenverlagend medicament (bijvoorbeeld statines) gebruiken

5. Oogonderzoek

5. Oogonderzoek

Indicator 5a: % diabetespatiënten met een fundusonderzoek in de afgelopen 24 maanden ¹

5. Oogonderzoek

Indicator 5b: % diabetespatiënten met diabetische retinopathie ¹

6. Voetonderzoek

6. Voetonderzoek

Indicator 6a: % diabetespatiënten met een voetonderzoek in de afgelopen 12 maanden

6. Voetonderzoek

Indicator 6b: % Patiënten met diabetes type 2 met een registratie van de Simm's classificatie van het voetonderzoek in de afgelopen 12 maanden

6. Voetonderzoek

Indicator 6c: % Patiënten met diabetes type 2 met diabetische voetafwijkingen (bevindingen voetonderzoek afwijkend bij laatste controle)

7. Roken

7. Roken

Indicator 7a: % diabetespatiënten waarvan het rookgedrag bekend is¹

7. Roken

Indicator 7b: % diabetespatiënten dat rookt van degene waarvan het rookgedrag bekend is¹

7. Roken

Indicator 7c: % diabetespatiënten dat rookt en een stoppen met roken advies heeft gekregen in de afgelopen 12 maanden¹

8. BMI

8. BMI

Indicator 8a: % Patiënten met diabetes type 2 bij wie de Body Mass Index geregistreerd is in de afgelopen 12 maanden I

8. BMI

Indicator 8b: % Patiënten met diabetes type 2 met een leeftijd jonger dan 70 jaar (< 70) bij wie de Body Mass Index lager is dan 25 kg/m² in de groep patiënten met een leeftijd jonger dan 70 jaar (< 70)

9. Voeding

9. Voeding

Indicator 9a: % Patiënten met diabetes type 2 waarbij het voedingspatroon is besproken in de afgelopen 12 maanden

10. Bewegen

10. Bewegen

Indicator 10a: % Patiënten met diabetes type 2 waarbij de mate van lichaamsbeweging is geregistreerd in de afgelopen 12 maanden

11. Alcohol

11. Alcohol

Indicator 11a: % Patiënten met diabetes type 2 waarbij het alcoholgebruik is geregistreerd in de afgelopen 5 jaar

12. Totaal controlebeleid

12. Totaal controlebeleid

Indicator 12a: % Patiënten met diabetes type 2 met de combinatie van gegevens op eerder genoemde procesindicatoren (HbA1c, bloeddruk, lipidenprofiel, nierfunctie, rookgedrag, BMI, voetonderzoek en oogonderzoek)